



مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی
خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

آبسه دندان



بخش فک و صورت

ناظر علمی: دکتر ریسباف

واحد آموزش سلامت

کد سند : KH-EDU-PM-117

تاریخ تدوین : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

عفونت دندان

مساله مهم در درمان عفونتهای دندان، یافتن علت آنهاست. در بسیاری موارد، یک دندان پوسیده که مدتهدرمان نشده گاهی هم یک دندان عقل نهفته درلثه ویاگا هی نیزضربه به دندان که باعث ترک آن شده، میتواندعامل ایجادعفونت باشد. عفونتهای دندانی در بسیاری موارد درنوک ریشه دندان متمرکزمی مانند، اما در بعضی موارد به بافتهای اطراف پخش می شوند که تاحدزیادی بستگی به مقاومت بدن فرد و قدرت باکتری دارد.



انواع عفونت دندان

اگر عفونت دندان دراستخوان نگهدارنده دور دندان (آلوئول) محدود بماند، التهاب استخوان رخ می دهد. در چنین حالتی دندان به ضربه حساس می شود و فرد حس میکند دندان کمی از حفره خود بیرون آمده است. حال اگر عفونت از استخوان خارج شود و وارد نسج نرم شود، تورم در آن رخ خواهد داد. در این حالت، عفونت در یک ناحیه، متمرکز نیست و چرکی هم وجود ندارد. به چنین حالتی سلولیت، گفته میشود اما اگر عفونت در یک محل متمرکز بماند و چرک هم ایجاد شود، آبسه تشکیل خواهد شد. آبسه ممکن است به عضلات فشار وارد کند و بیمار نتواند دهانش را به راحتی باز کند. گسترش عفونت های با منشأ دندانی، در موارد نادری حتی سبب ایجاد آبسه های مغزی و گاه مننژیت نیز میشود. پس مهم است که جدی گرفته شود.



علائم عفونت دندان

علائم موضعی عفونت دندان شامل :درد هنگام جویدن غذا،التهاب،قرمزی،حساسیت دندان به گرماوسرماوسخت بازشدن دهان است.
علائم عمومی عفونت دندان شامل :

تب، میزان نبض وتنفس بالاوالتهاب غددلنفاوی موضعی است .البته بسته به میزان پیشرفت عفونت،بعضی علامت ها بیشتروبعضی علامتها کمتر دیده می شوند عفونت هردندان می تواند مناطق گوناگونی ازرگروگردن را در گیر کند که بعضی از آنهاخطرناک خواهندبود

درمان عفونت دندان

هدف اصلی اذدرمان،خارج کردن منبع عفونت است دراغلب موارد باکشیدن دندان عفونی،عامل مولد ازیبین خواهدرفت. اگر آبسه تشکیل شده باشد .برش محل آبسه وتخلیه چرک ضروری خواهد بود.قسمت بعدی درمان بالا بردن قدرت دفاعی بیمار است آنتی بیوتیک مناسب استراحت کافی رساندن مایعات به بیمار دارو های ضد درد و دهانشویه مناسب می توانند دفاع شخص را بالا ببرند.



توصیه های پس از ترخیص

۱-چنانچه در محل آبسه درن وجود داردبایستی حداکثر۷۲ساعت بعدبه درمانگاه مراجعه نماید تا در صورت لزوم درن تعویض یا خارج شود .

۲-تعویض پانسمان روزانه ضروری می باشد.

۳-شستشوی مرتب داخل دهان چنانچه درن داخل دهانی باشدضرورت دارد.

۴-آنتی بیوتیک های تجویز شده راطبق دستورمصرف کنید.

۵-درصورت تب و لرز به درمانگاه مراجعه کنید



۶-درصورت علائمی نظیر استفراغ وتهوع و دل پیچه در اولین فرصت به پزشک خود مراجعه نمائید .

۷-در اولین فرصت ممکن نسبت به خارج کردن عامل عفونت که معمولاًدندان پوسیده است اقدام نمائید.

منبع: داخلی جراحی برونر سوارث ۲۰۱۸

آدرس: زاهدان، جام جم، بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تلفن ۳۳۲۲۰۵۰۱