



مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی
خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

اورتوگناتیک



بخش فک و صورت

ناظر علمی: دکتر ریسباف

واحد آموزش سلامت

کد سند : KH-EDU-PM-116

تاریخ تدوین : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

اطلاعات مفید در مورد درمان جراحی فک و صورت که باید بدانید:


در عمل جراحی فک که جراحی ارتوگناتیک نام دارد دارد، ناهنجاریهای استخوان فک یا ناهمراستایی آنها اصلاح می شود و در نتیجه فکها و دندانها عملکرد بهتری خواهند داشت. اصلاحات فک میتواند به بهبود توازن و زیبایی صورت نیز کمک کند در صورتی که مشکلات فک دارید که به تنهایی، با ارتودنسی اصلاح نمی شوند عمل جراحی فک گزینه اصلاحی مورد نیاز شماست. در بیشتر این موارد براکت نیز به دندانها متصل می شود تا نتیجه بهتری حاصل شود. براکت ارتودنسی ممکن است پیش از جراحی فک و یا در دوره بهبودی پس از جراحی فک تا زمانی که بهبودی و هم راستایی دندان ها کامل شود استفاده می شود.

عمل جراحی فک در چه سنی انجام می شود؟

عمل جراحی فک بر روی استخوان فک صورت می گیرد بنابراین باید سن رشد استخوانها به پایان برسد و معمولاً رشد استخوانها در دخترها بین ۱۴ تا ۱۶ سالگی و در پسرها بین ۱۷ تا ۲۱ سالگی تمام می شود. پس از آن میتوان عمل جراحی فک انجام داد.

جراحی فک پایین برای اصلاح موارد زیر به کار

می رود: عقب ماندگی فک پایین و جلو زدگی فک پایین



عمل جراحی فک بالا در چه مواردی انجام


می شود؟

- _ جلو زدگی یا عقب ماندگی شدید فک بالا
- _ اوپن بایت (باز ماندن جلوی دهان در هنگام بستن فکها) شکاف لب
- _ دیده نشدن دندانها یا بیش از حد دیده شدن دندانها در هنگام لبخند
- _ کمبود رشد میانه صورت

عمل جراحی چانه (جنیوپلاستی) در چه مواردی

انجام می شود؟

این جراحی برای اصلاح کوچک بودن یا عقب بودن چانه انجام می شود. در مواردی که فقط چانه عقب است و ارتباط بین دندانها چندان مشکل ندارد فقط جراحی چانه انجام می شود جلو بردن چانه : در عمل جراحی چانه، برش کوچکی در برجستگی پایین چانه ایجاد می شود و استخوان آن جلو کشیده می شود و سپس با پیچ و پلاک و یا با سیم در جای جدید ثابت می شود . همچنین ممکن است جراحی چانه برای کوچک کردن چانه های جلوزده انجام شود که در این صورت جلوی استخوان چانه برش خورده و برداشته می شود.



در برخی موارد استخوان اضافی به فک افزوده می شود. این استخوان ممکن است از ران یا دنده برداشته شود. استخوان پیوندی با پلاک و پیچ در جای خود ثابت می شود پس از هر عمل جراحی احتمالا درد یا ناراحتی تا حدی تجربه می شود. شایعترین عارضه عمل جراحی فک، درد پس از جراحی، کمی ورم اطراف صورت و بی حسی پایین صورت است که موقتی بوده و برطرف می شود .

آیا جای زخم روی صورت می ماند؟

معمولا برش از داخل دهان انجام می شود بنابراین هیچ جای زخمی در چانه، فک، دهان یا هر جای دیگری در صورتتان دیده نمی شود با این حالگاهی اوقات ممکن است لازم باشد برشهای کوچکی در خارج از دهان نیز ایجاد شود. پس از این جراحی معمولا یک الی دو روز باید در بیمارستان بستری بمانید. البته این زمان بستگی به حال و روز شما دارد و اگر نامساعد باشد ممکن است بیشتر در بیمارستان بمانید.



بعد از عمل جراحی فک چه نکاتی را باید رعایت

کنم؟

تا چند روز باید فقط مایعات بخورید و پس از آن به مدت ۴ تا ۶ هفته فقط غذاهای نرم مصرف می کنید و بعد از آن به برنامه غذایی معمولی خود برمی گردید در این جراحی هم همانند هر زخم دیگری باید مراقب باشید محل زخم همیشه تمیز بماند. معمولا جای زخم جراحی در داخل دهان قرار دارد. باید هر بار که چیزی می خورید دهان خود را با آب بشویید و دهانشویه استفاده کنید و دندانهایتان را از زمانی که پزشک به شما گفته است مسواک بزنید برای کنترل درد، داروهایی که برایتان تجویز شده را مصرف کنید.

منبع: داخلی جراحی برونر سوارث ۲۰۱۸

آدرس: زاهدان، جام جم، بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تلفن

۳۳۲۲۰۵۰۱