



مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

سرطان دهان



بخش فک و صورت

ناظر علمی : دکتر ریس باف
واحد آموزش سلامت

کدند : KH-EDU-PM-123
تاریخ تدوین : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

سرطان چیست :

به رشد بی رویه و غیرطبیعی سلولها سرطان گفته می‌شود. تکثیر بیرونیه سلولها ایجاد بافت اضافی می‌کند که به آن تومور می‌گویند که میتواند خوش خیم یا بد خیم باشد. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند وغلب بعد از برداشتن دوباره عود نمی‌کند و قادر نیستند در بدن انتشار یافته و بافت‌های دیگر را درگیر کنند. تومورهای بد خیم سرطان هستند و بافت‌ها و اندام‌های نزدیک خود را درگیر و تخریب می‌کنند. گاهی سلولهای سرطانی از تومور کنده شده واژطريق خون یا لymph در بدن پخش شده و در سایر نواحی بدن انتشار یافته که اصطلاحاً به آن متاستاز گفته می‌شود.

سرطان دهان:

براساس اعلام انجمن سرطان آمریکا سرطان دهان ششمین سرطان شایع در مردان می‌باشد و مردان دو برابر زنها مبتلا می‌گردند مردان بالای ۵۰ سال بیشتر در معرض خطر می‌باشند.

سرطان دهان شامل سرطان لب، کف دهان، گونه،
لثه ...



علل سرطان دهان:

استعمال دخانیات : افرادی که سیگار یا پیپ می‌کشند شش برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلا قرار دارند جویدن تنباکو ۵۰ برابر بیشتر احتمال ابتلا به سرطان لثه، گونه و لب را افزایش میدهد. هر چه سن شروع اعتیاد کمتر و تعداد مصرف سیگار بیشتر باشد خطر بیشتر است.

الکل : مصرف الکل بدلیل تحریک مداوم و مزمون مخاط دهان مصرف کننده را در خطر ابتلا قرار میدهد. مصرف همزمان الکل و سیگار اثر تشدید کننده دارد. اشعه : گاما و ، افرادی که در زمان طولانی در معرض پرتو اشعه هستند شанс ابتلاء بیشتری دارند

بیماریهای عفونی: بیماریهای التهابی، ارثی و ایمنی:

بیماران با سابقه (لوكوبلاکی) لکه های سفید داخل دهان (واریتروپلاکی) ضایعات قرمزرنگ دهان ، افراد با سابقه ابتلا سرطان درخانواده و کسانی که بیش از حد در معرض نور آفتاب قرار دارند در خطر بیشتری هستند.

بیماریهای تغذیه ای و متابولیک : فقر آهن و کمبود ویتامین B12

علائم بیماری

زخم بر روی لب یا داخل دهان که بهبود نمی یابد.

بر جستگی بر روی لب یا داخل دهان و حلق لکه های سفیدیاقدامزروی لثه، زبان یا پوشش مخاط دهان خونریزی، درد یا بیحسی غیرمعمول دردهان و جویدن یا بلع مشکل و دردناک بسیاری از موارد سرطان های دهان در مراحل اولیه بروندرسوزش هستند تغییر صدا و احساس گرفتگی گلوودرد گوش تورم فک که باعث احساس ناراحتی و عدم انطباق دندانهای مصنوعی شود.



تشخیص بیماری:

با معاینه ساده یک دندان پزشک ضایعه غیر طبیعی یا زخم و توده مشکوک دردهان مشاهده شده و بوسیله یک بیوپسی تکه برداری و انجام آزمایش توسط پاتولوژیست سرطان دهان قابل تشخیص است. در صور تشخیص سرطان از بیمار جهت اطلاع از میزان انتشار و تهیه شده و عدد MRI نواحی در گیر عکسبرداری، سیتیاسکن لونفاوی گردن نیز معاینه میگردد.

درمان

نوع درمان بر اساس محل، اندازه و نوع، میزان انتشار و مرحله پیشرفت، سن و سلامت عمومی بیمار تعیین میشود.

انواع درمان:

جراحی: برداشتن تومور معمول ترین راه درمان

است. اگر احتمال انتشار سرطان وجود داشته باشد عدلنفاوی گردن نیز تخلیه میگردد. برای درمان روش جهت تخریب سلولهای سرطانی از رادیوتراپی اشعه یونیزان بالائزی بالاستفاده میشود. رادیوتراپی یمکن است بصورت تابش خارجی یا تابش داخلی استفاده از ماده رادیواکتیو در داخل تومور انجام گردد.

شیمی درمانی: در این روش بالاستفاده از دارو سلولهای سرطانی کشته میشوند.

عارض جانبی درمان:

عارض جانبی درمان سرطان بوسیله جراحی بسته به میزان و نوع انتشار گوناگون است. در جراحی های وسیع که بخشهایی از کام، زبان یا فک بیمار برداشته میشود، توانایی بیمار برای جویدن و بلع، صحبت کردن و ظاهر بیمار تحت تاثیر قرار میگیرد.

آدرس:

Zahedan, JAM JAM, Biostan Khadem Al-Eslami (CH) Phone: ۳۳۲۲۰۵۱

منبع: داخلی جراحی برونر سودارت ۲۰۱۸