




مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

تراکشن



بخش ارتوپدی ناظر علمی : دکتر اکاتی واحد آموزش سلامت

کد سند : KH-EDU-PM-56

تاریخ تدوین : 1402/04/01

تاریخ بازنگری : 1403/04/01

تراکشن

استفاده از تراکشن (کشش) یکی از روش های مهم و رایج در بیماران بخش ارتوپدی است که معمولاً در شکستگیهای اندام تحتانی برای جا اندازی شکستگی قبل از عمل جراحی استفاده می شود.

کشش به طور اولیه به عنوان یک مداخله ی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد تا زمانی که امکان استفاده از روش هایی همچون ثابت سازی خارجی یا داخلی میسر شود.

از کشش برای کاهش اسپاسم عضلانی، جا انداختن و محور بندی و ثابت سازی شکستگی ها ، کاهش دفورمیتی و افزایش فضای بین سطوح متقابل استفاده می شود . کشش به دو نوع پوستی و اسکلتی تقسیم می شود : کشش اسکلتی مستقیماً روی استخوان اعمال می شود. از این شیوه کشش برای درمان شکستگی های استخوان ران، درشت نی، بازو و مهره های گردنی استفاده می شود . کشش اسکلتی با استفاده از یک میخ فلزی یا سیمی مستقیماً روی استخوان اعمال می شود. زمانی که بی حرکت کردن نسبی به طور موقت مد نظر باشد از کشش پوستی استفاده می شود .

اندام باید قبل از برقراری کشش تمیز و خشک باشد. در طی کشش درمانی، ورزش مناسب به منظور پیشگیری از تحلیل عضالت و مفاصلی که تحت کشش نیستند توصیه می گردد .

در حین ورزش باید نیروهای کشش در جهت درست خود قرار داشته باشند و بیمار در وضعیت مناسب باشد تا از عوارض ناشی از محور نادرست بدن پیشگیری شود.

اصول کشش مؤثر

- ✓ کشش می بایستی مداوم باشد تا در جهت جانداختن و بی حرکت کردن شکستگی مؤثر واقع شود. کشش اسکلتی هرگز نباید قطع شود .
- ✓ وزنه ها برداشته نمی شوند مگر اینکه کشش به صورت متناوب تجویز گردد .
- ✓ بیمار تحت کشش زمانی که در مرکز تخت خود قرار دارد در بهترین حالت محور بندی واقع می شود
- ✓ طناب تراکشن باید بدون گره باشد.
- ✓ وزنه ها باید آزادانه آویزان باشند و با تخت و یا کف زمین در تماس نباشند .
- ✓ گره ی ریسمان ها نباید قرقره و پایه ی تخت را لمس کند.

پیشگیری از عوارض :

1. زخم های فشاری: بیماری که در وضعیت خوابیده به پشت قرار می گیرد بیشتر در معرض خطر زخم فشاری قرار دارد لذا بایستی حداقل هر 2 ساعت مراقبت از پشت بیمار به عمل آید . چون بیمار در بستر بی حرکت می باشد الزم است تشک سفت باشد . تغییر وضعیت بیمار در محدوده ی کشش، فشار روی قسمت های وابسته ی بدن را کاهش می دهد . تعویض ملحفه ی رختخواب و صاف کردن چین و چروک آن می بایستی به طور مرتب انجام شود.

2. یبوست و بی اشتهايي: بي حرکتی سبب کاهش

حرکات لوله ي گوارشي و متعاقباً یبوست وبي اشتهايي مي گردد. يک رژيم غذايي با فيبر زياد و مایعات کافي ممکن است تحرک لوله ي گوارشي را موجب شود.

3. عفونت ادراری: تخلیه ي ناقص مثانه در اثر

ضعیت بیمار در تخت (خوابیده به پشت) و عدم مصرف مایعات به دلیل ناراحتي در استفاده از لگن فرد را مستعد عفونت ادراري مي کند. لذا بیمار باید تشویق شود تا مایعات فراوان بنوشد و هر 3 ساعت يک بار ادرار کند. در صورت استفاده از سوند ادراري رعایت نکات استریل در حین سنداژ حایز اهمیت است.

4. رکود خون وریدی و ترومبوز وریدهای

عمقی: بیمار باید از نظر عالیم ایجاد لخته در عروق

پا ها که شامل حساسیت ساق پا ، گرما ، تورم يا قرمزي مي باشد آگاه باشد. بیمار به منظور پیشگیری از کم آبی و تغلیظ خون که هر دو موجب رکود خون مي شوند به مصرف مایعات تشویق جهت افزایش بازگشت وریدی بیمار به انجام . گردد انقباضات ایزومتریک در اندام تحت کشش تشویق مي گردد ممکن است پزشک جهت پیشگیری از ایجاد لخته در پاها به دنبال بي حرکتی، داروهای ضد انعقاد نظیر آمپول کلگزان راتجویز نماید.

نکات ضروری در مراقبت از تراکشن:

- ✓ تداوم تراکشن برای اینکه برنامه ی درمانی بهتر شود، الزم است.

✓ اجتناب از چین خوردگی و لغزیدن بانداژ

کشی جهت حفظ نیروی متقابل کشش.

✓ وزنه ها آزادانه آویزان باشند و به کف زمین یا تخت

برخورد نکنند. بندهای کشش گره نداشته باشند (زیرا باعث کاهش کشش مورد نظر می شود).

✓ به هیچ عنوان پیچ ها و گیره ها دستکاری نشود.

✓ در مورد تراکشن استخوانی، دو انتهای پین یا سیم

تراکشن استخوانی با یک حفاظ پوشانده می شود

(این کار از آسیب به بیمار و پرسنل جلوگیری می کند).

✓ حفظ بهداشت به خصوص در محل پین برای

پیشگیری از عفونت بسیار مهم است

✓ ملحفه باید بدون چروک و خشک نگه داری شود.

✓ برای ایمنی نرده ها بالا برده شود.

✓ عضلات مبتلا را 5 الی 11 ثانیه منقبض کرده و

سپس رها سازید. این کار را چند بار در روز انجام

دهید. باید به خاطر داشت که فعالیت ورزشی برای

حفظ قدرت عضله و بهتر شدن جریان خون خیلی

اهمیت دارد.

✓ حرکت فعال شامل گرفتن حلقه و خم و راست کردن

مچ پا و به حرکت درآوردن مفاصل غیر مبتال و

ورزش های ایزومتریک اندام بی حرکت (ورزش

عضالت چهار سر ران و عضالت باسن) از ضروریات

است.

✓ نوشیدن مایعات کافی به برقراری جریان ادرار و

جلوگیری از یبوست کمک می کند.

✓ انجام سرفه و تنفس عمیق سبب اتساع ریه ها شده

و از عفونت ریه و آتلکتازی جلوگیری می کند.

✓ شرکت کردن بیمار در انجام برنامه های مراقبت و

درمان موجب جلوگیری از افسردگی و ناراحتی

ناشی از هفته ها بی حرکتی می شود.



منبع: برونر و سودارث 0222

آدرس : زاهدان بلوار جام جم

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

054-33220501